

Fragebogen A – Questionario A

<p>1 Kontraindikation für das Stillen:</p> <p>a) HCV positive Mutter b) Mutter mit Herpes labialis c) Konsum von mehr als 15 Zigaretten pro Tag d) Neugeborenes mit Galaktosämie</p>	<p>1 Cos'è la disuria?</p> <p>a) impossibilità a minzionare b) difficoltà a minzionare c) dolore alla minzione d) nessuna delle precedenti</p>
<p>2 Der Stillkodex zum erfolgreichen Stillen von UNICEF und WHO empfiehlt:</p> <p>a) dem Neugeborenen innerhalb einer Stunde nach der Geburt Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Mutter zu ermöglichen b) dem Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Mutter zu ermöglichen c) Es gibt keine Zeitangabe, wann der Haut-zu-Haut-Kontakt beginnen sollte d) keine der oben genannten Möglichkeiten</p>	<p>2 Quali sono i sintomi comuni da ritenzione di materiale placentare e/o membrane amniotiche:</p> <p>a) Dolore addominale o pelvico, prolungato e eccessivo sanguinamento vaginale, febbre b) Incremento della produzione del latte materno c) Difficoltà respiratoria d) Ritenzione urinaria</p>
<p>3 Das mütterliche Plasmavolumen:</p> <p>a) verdoppelt sich b) erhöht sich um über 500 ml c) erhöht sich um über 1000 ml d) nichts des oben Genannten</p>	<p>3 Il periodo neonatale va:</p> <p>a) dal 1° al 28° giorno di vita b) dal 1° al 5° giorno di vita c) dalla 1 alla 24 ora di vita d) nessuna delle precedenti</p>
<p>4 Pfannenstiel war Namengebend für:</p> <p>a) Die transversale Inzision des Abdomens b) Die Drehung des Fötus mit äußeren und inneren Manövern c) Dem extraperitonealen Kaiserschnitt d) Keine der oben genannten Möglichkeiten</p>	<p>4 Rappresenta una controindicazione all'allattamento al seno:</p> <p>a) Madre HCV positiva b) Madre affetta da herpes labiale c) Consumo di più di 15 sigarette al giorno d) Neonato affetto da galattosemia</p>
<p>5 Die als physiologisch definierte Fruchtwassermenge beträgt:</p> <p>a) 5-25 cm b) 5-8 cm c) 22-25 cm d) >25 cm</p>	<p>5 Quando la frequenza Cardiaca fetale (FCF) si definisce tachicardia grave?</p> <p>a) > 170 BPM b) > 200 /220 BPM c) < 200/220 BPM d) Nessuna delle precedenti</p>
<p>6 Geben Sie die Inkubationszeit der Windpocken an:</p> <p>a) 14-21 Tage b) 1-5 Tage c) 21 Tage d) 21-28 Tage</p>	<p>6 In quale anno sono entrati in vigore i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?</p> <p>a) 1993 b) 1999 c) 2002 d) nessuna delle precedenti</p>
<p>7 Welche der folgenden Substanzen wirkt als „Antidot“ bei einer Überdosierung mit Magnesiumsulfat?</p> <p>a) Nifedipin b) Adrenalin c) Calciumgluconat d) keine der genannten Substanzen</p>	<p>7 Indicare, fra le seguenti proposte, la controindicazione assoluta all'induzione del travaglio di parto:</p> <p>a) Placenta praevia b) CTG non rassicurante c) Macrosomia fetale d) Nessuna delle precedenti</p>

Fragebogen A – Questionario A

8	<p>Was kennzeichnet das Patau-Syndrom?</p> <p>a) Trisomie des Chromosoms 13 b) Trisomie des Chromosoms 15 c) Trisomie des Chromosoms 20 d) nichts des oben Genannten</p>	8	<p>Il volume plasmatico materno:</p> <p>a) Raddoppia b) aumenta di oltre 500 ml c) aumenta di oltre 1000 ml d) nessuna delle precedenti</p>
9	<p>Was ist NIPT?</p> <p>a) ein invasiver pränataler Test b) eine nicht-invasive vorgeburtliche Untersuchung c) eine Chromosomenanomalie d) eine strukturelle Anomalie</p>	9	<p>La diagnosi di placenta previa è essenzialmente:</p> <p>a) di laboratorio b) clinica c) ecografica d) nessuna delle precedenti</p>
10	<p>Welches der folgenden Manöver ermöglicht bei einer Schulterdystokie das Herausziehen des hinteren Arms?</p> <p>a) Mc Roberts b) Jacquemier c) Rubin II d) keine der oben Genannten</p>	10	<p>Nell'evoluzione clinica dell'attacco eclamptico il IV periodo è definito:</p> <p>a) coma b) invasione c) tonico-clonico d) nessuna delle precedenti</p>
11	<p>Was ist Dysurie?</p> <p>a) Unfähigkeit zu urinieren b) Schwierigkeiten beim Urinieren c) Schmerzen Urinieren d) nichts des oben Genannten</p>	11	<p>Solitamente l'ittero fisiologico rientra entro:</p> <p>a) 7-10 giorni b) 3 giorni c) 5-10 giorni d) nessuna delle precedenti</p>
12	<p>Das Risiko eines Schwangerschaftsabbruchs nach einer Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese - Linee Guida SIEOG 2015) liegt bei:</p> <p>a) 1% b) 2% c) Zwischen 0,1%-0,5% d) Keine der obigen Antworten ist richtig</p>	12	<p>Quale delle seguenti sostanze funge da „antidoto“ per le intossicazioni da solfato magnesio?</p> <p>a) Calcio gluconato b) Nifedipina c) Adrenalina d) Nessuna delle precedenti</p>
13	<p>Welches der folgenden Manöver vergrößert den Beckendurchmesser im Falle einer Schulterdystokie?</p> <p>a) Mc Roberts b) Jacquemier c) Rubin II d) Zavanelli</p>	13	<p>In caso di mal posizione fetale in sacrale quale delle seguenti posizioni materne è sconsigliata?</p> <p>a) Sul fianco b) Rotazione interna dei femori c) Litotomica d) Carponi</p>
14	<p>In welchem Jahr traten die Essential Levels of Assistance (LEA) in Kraft?</p> <p>a) 1993 b) 1999 c) 2002 d) nichts des oben Genannten</p>	14	<p>Indicare il periodo di incubazione della varicella:</p> <p>a) 14-21 giorni b) 1-5 giorni c) 21 giorni d) 21-28 giorni</p>

Fragebogen A – Questionario A

<p>15</p>	<p>Der Apgar-Index wird ermittelt:</p> <p>a) durch die Summe der Werte, die unter Berücksichtigung von fünf Vitalparametern des Neugeborenen ermittelt wurden: Herztätigkeit, Atmungstätigkeit, Muskeltonus, Reaktion auf Reize und Hautfarbe</p> <p>b) die Summe der Werte für drei Vitalparameter des Neugeborenen: Herztätigkeit, Muskeltonus, Reflexe</p> <p>c) die Summe der Werte, die unter Berücksichtigung von vier Vitalparametern des Neugeborenen ermittelt wurden: Herzfrequenz, Atmungstätigkeit, Muskeltonus, Hautfarbe</p> <p>d) durch die Summe der Werte, die unter Berücksichtigung von zwei Vitalparametern des Neugeborenen ermittelt werden: Herzfrequenz und Atmungstätigkeit</p>	<p>15</p>	<p>Il decalogo UNICEF – OMS per l'allattamento al seno consiglia:</p> <p>a) di mettere in contatto pelle a pelle il neonato con la mamma entro un'ora dalla nascita</p> <p>b) di mettere in contatto pelle a pelle il neonato con la mamma immediatamente dopo la nascita</p> <p>c) non indica i tempi entro quali è consigliato l'inizio del contatto pelle a pelle</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
<p>16</p>	<p>Was ist bei schwerer Gelbsucht aufgrund einer hämolytischen Erkrankung des Neugeborenen zu beachten?</p> <p>a) Transaminasen</p> <p>b) Bilirubin</p> <p>c) Protidämie</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	<p>16</p>	<p>Quale delle seguenti manovre, in caso di distocia di spalla, aumenta i diametri della pelvi?</p> <p>a) Mc Roberts</p> <p>b) Jacquemier</p> <p>c) Rubin II</p> <p>d) Zavanelli</p>
<p>17</p>	<p>Die Diagnose einer Plazenta praevia wird im Wesentlichen gestellt mittels:</p> <p>a) Labor</p> <p>b) Klinik</p> <p>c) Ultraschall</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	<p>17</p>	<p>L' infezione da papillomavirus (HPV) e' correlata all' insorgenza di:</p> <p>a) Carcinoma della vulva</p> <p>b) Carcinoma della cervice</p> <p>c) Carcinoma della vagina</p> <p>d) Nessuna delle precedenti</p>
<p>18</p>	<p>Die Neugeborenenperiode dauert:</p> <p>a) vom 1. bis zum 28. Lebenstag</p> <p>b) vom 1. bis zum 5. Lebenstag</p> <p>c) von 1 bis 24 Stunden Leben</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	<p>18</p>	<p>Si parla di normopeso con BMI:</p> <p>a) tra 16 e 18.49</p> <p>b) tra 18.5 e 24.99</p> <p>c) < 16.5</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
<p>19</p>	<p>Physiologischer Ikterus legt sich normalerweise wieder innerhalb:</p> <p>a) 7-10 Tage</p> <p>b) 3 Tage</p> <p>c) 5-10 Tage</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	<p>19</p>	<p>La quantità di liquido amniotico definita fisiologica è di:</p> <p>a) 5-8 cm</p> <p>b) 5-25 cm</p> <p>c) 22-25 cm</p> <p>d) >25 cm</p>

Fragebogen A – Questionario A

20	<p>Geben Sie den Zeitraum an, innerhalb dessen sich die hintere Fontanelle schließt:</p> <p>a) 6 Monate alt b) 8 Monate alt c) 2 Monate alt d) nichts des oben Genannten</p>	20	<p>Il rischio di interrompere una gravidanza in seguito ad amniocentesi (Linee Guida SIEOG 2015) è:</p> <p>a) Dell'1% b) Del 2% c) Nessuna delle precedenti d) Compreso tra 0,1-0,5%</p>
21	<p>Was ist die häufigste Fraktur bei Neugeborenen?</p> <p>a) Oberarm b) Schlüsselbein c) Femur d) nichts des oben Genannten</p>	21	<p>Cos'è il NIPT?</p> <p>a) un esame prenatale non invasivo b) un esame prenatale invasivo c) un'anomalia cromosomica d) un'anomalia strutturale</p>
22	<p>Die Infektion mit dem Papillomavirus (HPV) steht im Zusammenhang mit dem Auftreten von:</p> <p>a) Karzinom der Vulva b) Karzinom der Vagina c) Karzinom der Zervix d) Keiner der oben genannten Möglichkeiten</p>	22	<p>Pfannenstiel ha legato il suo nome:</p> <p>a) All'incisione trasversale dell'addome b) Al rivolgimento del feto con manovre esterne ed interne c) Al taglio cesareo extraperitoneale d) Nessuna delle precedenti</p>
23	<p>Eine absolute Kontraindikation für die Einleitung der Wehen ist:</p> <p>a) Placenta praevia b) Suspektes CTG c) Fetale Makrosomie d) Keine der oben genannten Möglichkeiten</p>	23	<p>Cosa è necessario monitorare nell'ittero grave da malattia emolitica del neonato?</p> <p>a) la transaminasi b) la bilirubina c) la protidemia d) nessuna delle precedenti</p>
24	<p>Wann wird die fetale Herzfrequenz (FHF) als schwere Tachykardie bezeichnet?</p> <p>a) > 170 Spm b) > 200/220 Spm c) < 200/220 Spm d) Keiner der oben genannten Fälle</p>	24	<p>Quale delle seguenti manovre, in caso di distocia di spalla, permette l'estrazione del braccio posteriore?</p> <p>a) Jacquemier b) Mc Roberts c) Rubin II d) Nessuna delle precedenti</p>
25	<p>Welche der folgenden mütterlichen Positionen wird im Falle einer Rotation des Rückens nach hinten (hintere Hinterhauptslage) nicht empfohlen?</p> <p>a) Steinschnittlage b) Seitenlage c) Innenrotation der Oberschenkel d) Vierfüßlerstand</p>	25	<p>Cosa si intende per p-PROM?</p> <p>a) rottura intempestiva delle membrane amniocoriali < 30 settimana di gestazione b) rottura intempestiva delle membrane amniocoriali < 36 settimana di gestazione c) rottura intempestiva delle membrane amniocoriali < 33 settimana di gestazione d) rottura intempestiva delle membrane amniocoriali < 37a settimana di gestazione</p>

26	<p>Welche sind die typischen Symptome bei einem Plazentarest und/oder Eihäute in der Gebärmutter, nach der Geburt:</p> <p>a) Unterleibs- oder Beckenschmerzen, verlängerte und übermäßige vaginale Blutungen, Fieber</p> <p>b) Erhöhte Produktion von Muttermilch</p> <p>c) Atemnot</p> <p>d) Urinstau</p>	26	<p>Gli screening neonatali resi obbligatori dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono:</p> <p>a) fenilchetonuria, intolleranza al lattosio e fibrosi cistica</p> <p>b) fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica</p> <p>c) morbo di Cooley, intolleranza al lattosio e fibrosi cistica</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
27	<p>Wir sprechen vom Normalgewicht mit BMI:</p> <p>a) zwischen 16 und 18,49</p> <p>b) zwischen 18,5 und 24,99</p> <p>c) < 16,5</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	27	<p>Indicare il periodo entro il quale la fontanella posteriore si chiude:</p> <p>a) 6 mesi di vita</p> <p>b) 8 mesi di vita</p> <p>c) 2 mesi di vita</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
28	<p>Was versteht man unter p-PROM?</p> <p>a) vorzeitiger Blasensprung < 37 Schwangerschaftswochen</p> <p>b) vorzeitiger Blasensprung < 36 Schwangerschaftswochen</p> <p>c) vorzeitiger Blasensprung < 33 Schwangerschaftswochen</p> <p>d) vorzeitiger Blasensprung < 30 Schwangerschaftswochen</p>	28	<p>Cosa caratterizza la sindrome di Patau?</p> <p>a) trisomia del cromosoma 15</p> <p>b) trisomia del cromosoma 13</p> <p>c) trisomia del cromosoma 20</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
29	<p>In der klinischen Entwicklung des eklamptischen Anfalls wird die IV-Periode definiert als:</p> <p>a) Invasion</p> <p>b) Koma</p> <p>c) tonisch-klonisch</p> <p>d) keine der oben genannten</p>	29	<p>Qual è la frattura di più frequente riscontro nel neonato?</p> <p>a) clavicola</p> <p>b) omero</p> <p>c) femore</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
30	<p>Die Neugeborenen-Screening, die durch das Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 104 obligatorisch geworden sind:</p> <p>a) Phenylketonurie, Laktoseintoleranz und Mukoviszidose</p> <p>b) Phenylketonurie, angeborene Hypothyreose und Mukoviszidose</p> <p>c) Cooley-Krankheit, Laktoseintoleranz und Mukoviszidose</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	30	<p>L'indice di Apgar si ottiene:</p> <p>a) dalla somma dei punteggi ottenuti considerando cinque parametri vitali nel neonato: attività cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, reattività agli stimoli e colorito cutaneo</p> <p>b) dalla somma dei punteggi ottenuti considerando tre parametri vitali nel neonato: attività cardiaca, tono muscolare, riflessi</p> <p>c) dalla somma dei punteggi ottenuti considerando quattro parametri vitali nel neonato: frequenza cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, colorito della pelle</p> <p>d) dalla somma dei punteggi ottenuti considerando due parametri vitali nel neonato: frequenza cardiaca e attività respiratoria</p>